

PREFEITURA DE TAKAHAMA INFORMA

高浜市役所のお知らせ



Foi iniciada a vacinação preventiva contra o Câncer do Colo do Útero (HPV), Influenza tipo b (Hib) e Doenças pneumocócicas infantis (vacina pneumocócica pediátrica).

子宮頸がん予防(HPV)ワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの
接種が開始になりました

Estas vacinas são opcionais. Considere a eficácia, a segurança e as reações que poderão causar, ao decidir tomá-las.

- ◆ Período de vacinação: até 31 de março de 2012(Heisei 24).
- ◆ Como tomar a vacina: Para o público alvo, enviaremos o cupom de vacinação. As vacinas serão aplicadas em instituições médicas (hospitais e clínicas) da cidade.
- ※ Para tomar a vacina, levar o cupom de vacinação e a caderneta materno-infantil *boshi techou* (indispensável para a vacinação contra a influenza tipo b e as doenças pneumocócicas infantis).
- ※ Favor consultar em relação às instituições médicas.
- ◆ Público alvo: de acordo à tabela abaixo. A vacinação é gratuita.

Vacinas	Idade alvo	Doses	Intervalos entre as doses
Câncer do colo do útero (HPV)	Meninas entre o 1º ano gina-sial (aprox. 13 anos) e o 1º ano colegial (aprox. 16 anos) em 2010 (Heisei 22)	3 doses	1ª dose 2ª dose: após 1 mês 3ª dose: após 6 meses
Influenza tipo b (Hib)	De 2 a 7 meses incompletos	1ª vez: 3 doses Reforço	4 a 8 semanas geralmente após 1 ano
	De 7 a 12 meses incompletos	1ª vez: 3 doses Reforço	4 a 8 semanas geralmente após 1 ano
	De 1 a 5 anos incompletos	1 dose	
Pneumocócica Pediátrica	De 2 a 7 meses incompletos	1ª vez: 3 doses Reforço	no mínimo 27 dias no mínimo 60 dias após a 3ª dose
	De 7 a 12 meses incompletos	1ª vez: 2 doses Reforço	no mínimo 27 dias no mínimo 60 dias após a 2ª dose
	1 ano	2 doses	2ª dose: mínimo 60 dias após a 1ª
	De 2 a 5 anos incompletos	1 dose	

Informações: Iki Iki Hiroba Hoken Fukushi Group ☎52-9871